

Factores de riesgo en pacientes tratados por toxicomanías



Louis-Leopold Bouilly, «Treinta y seis cabezas con expresiones» (detalle) s. XIX

Mediante la identificación de los factores que intervienen en el deterioro durante el tratamiento o después de él, en pacientes tratados por adicciones, se logró generar un índice con valor predictivo para determinar *a priori* qué pacientes están en riesgo de desmejorar con la terapia.

Rudolf H. Moos, Columnista Experto (especial para SIIC), Palo Alto, EE.UU.

(Continúa en página 5)

Artículos originales

Aislamiento de las venas pulmonares: el clímax de la cirugía para la fibrilación auricular

Ovidio A. García-Villarreal, *Nuevo León, México* pág. 9

Portación rinofaríngea de *Neisseria meningitidis*

María Cristina Ronconi, *Resistencia, Chaco, Argentina* pág. 11

El ultrasonido tridimensional Doppler en la evaluación de los vasos placentarios

Ratko Matijevic, *Zagreb, Croacia* pág. 15

Nuevas modalidades terapéuticas para el carcinoma de hipofaringe

Russell W. Hinerman, *Florida, EE.UU.* pág. 19

Diferenciação entre nódulos malignos e benignos da mama de acordo com as características sonográficas

Ruffo de Freitas Júnior, *Goiânia, Goiás, Brasil* pág. 21

Tratamiento intervencionista de las lesiones aisladas de la arteria coronaria descendente anterior proximal

José Valencia Martín, *Alicante, España* pág. 22

Neumonías adquiridas en la comunidad

Dr. Domingo Palmero, *Buenos Aires, Argentina* pág. 24