


## Avances en el Tratamiento de la Dermatitis Atópica

La dermatitis atópica es un trastorno complejo, multifactorial y difícil de tratar. Las terapias actuales de primera y segunda elección tienen limitaciones de eficacia y seguridad.

← Cureus



## Tratamiento Previo con 5-Fluorouracilo Tópico Aumenta la Eficacia de la Terapia Fotodinámica

Se demuestra que el tratamiento con 5-fluorouracilo antes de la terapia fotodinámica es más eficaz que la terapia fotodinámica como única modalidad terapéutica.


← Photodiagnosis and Photodynamic Therapy



## Eficacia y Seguridad de la Crema con Colchicina con 5-Fluorouracilo para el Tratamiento del Campo de Cancerización Cutánea

Se demuestra que el uso tópico de colchicina al 0.5% o 5-fluorouracilo al 5% es eficaz para el tratamiento del campo de cancerización cutánea, con tasas de eliminación completa y parcial similares a los 90 días.

← Anais Brasileiros de Dermatologia



## Rehidratación Oral en Pacientes con Síndrome de Intestino Irritable y Diarrea Crónica

En pacientes con síndrome de intestino irritable y diarrea crónica como manifestación predominante, la solución medicinal a base de aminoácidos se tolera bien y mejora los síntomas gastrointestinales.

← World Journal of Gastrointestinal Pharmacology and Therapeutics



## Calidad de Vida de los Pacientes con Síndrome de Intestino Irritable

En comparación con otros síntomas, los síntomas psicológicos, en particular la ansiedad, son más comunes y tienen una influencia más negativa en la calidad de vida, en pacientes con síndrome de intestino irritable.

← Journal of Gastroenterology and Hepatology



## Tratamiento del Síndrome de Intestino Irritable en Niños y Adolescentes

El abordaje del síndrome de intestino irritable pediátrico debe individualizarse sobre la base de las características de la enfermedad y el paciente, y seguir un enfoque multidisciplinario.

← Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology