

La colección **Excelentes Residentes** destaca los artículos principales publicados durante el trimestre anterior en la sección *ACISE Residentes* del sitio *siicsalud* (www.siicsalud.com/residentes). Los breves conceptos y referencias que acompañan a los títulos permiten elegir los artículos que el lector podrá consultar ampliados copiando las direcciones de sus páginas o mediante el escaneo del correspondiente código CRR.

Excelentes Residentes, serie **Cardiología**, es una publicación que integra el programa Actualización Científica sin Exclusiones (ACISE) para Residentes en Cardiología de Argentina (ACISERA en Cardiología).*

Número 12




Revisión del Estado Actual del Tratamiento de la Fibrilación Auricular

La ablación de la fibrilación auricular es un procedimiento que avanzó rápidamente, y en la actualidad se han incorporado mejores tecnologías para el tratamiento de los casos paroxísticos y persistentes.

Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
www.siicsalud.com/dato/resic.php/153611



Revista del CONAREC
32(136):196-201, 2016




Eficacia del Tratamiento de la Hipertensión Pulmonar Tromboembólica Crónica

El tratamiento de elección de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica es la endarterectomía pulmonar, potencialmente curativa.

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España
www.siicsalud.com/dato/crosiic.php/152116



Salud i Ciencia
21(8):868, Abr 2016



Parámetros Electrocardiográficos e Hipertensión Arterial

La amplitud de la onda T en varias derivaciones del electrocardiograma, la presión arterial determinada durante 24 horas y la hipertensión arterial diurna se asocian de manera significativa. La alteración en los patrones de repolarización podría indicar la remodelación temprana del ventrículo izquierdo inducida por la presión arterial.

University Hospital Basel, Basilea, Suiza
www.siicsalud.com/dato/resic.php/150282



International Journal of Cardiology
20:2300-2304, Ene 2016



Una Nueva Escala para el Diagnóstico de Fragilidad después de Síndromes Coronarios Agudos

Se propone un modelo predictivo, de gran valor pronóstico, que incluye variables clínicas y marcadores bioquímicos, que representa una herramienta simple para evaluar la fragilidad de los pacientes que han presentado un síndrome coronario agudo.

Universidad de Valencia, Valencia, España
www.siicsalud.com/dato/resic.php/149959



Canadian Journal of Cardiology
31(12):1462-1468, Dic 2015



Asociación entre la Fibrilación Auricular y la Insuficiencia Cardíaca

Más de la mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca presenta fibrilación auricular, en tanto que en más de la tercera parte de aquellos con fibrilación auricular aparece insuficiencia cardíaca. La presencia simultánea de ambas afecciones confiere un pronóstico más desfavorable.

Boston University, Boston, EE.UU.
www.siicsalud.com/dato/resic.php/152575



Circulation
133(5):484-492, Feb 2016



Evaluación sobre los Efectos del Embarazo en Mujeres con Cardiopatías Congénitas

Un gran porcentaje de pacientes con cardiopatías congénitas logran ahora sobrevivir hasta la adultez. A pesar de ello, el embarazo en las pacientes con estos cuadros puede asociarse con diversos riesgos.

National Taiwan University Children Hospital, Taipei, Taiwán (República Nacionalista China)
www.siicsalud.com/dato/resic.php/149851



Acta Cardiologica Sinica
31(6):500-506, Nov 2015



Insuficiencia Renal Aguda en la Insuficiencia Cardíaca Aguda Descompensada

El momento de aparición de la insuficiencia renal aguda parece importante para predecir la evolución y el riesgo de mortalidad a los 12 meses en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda descompensada. La insuficiencia renal aguda de aparición tardía, 5 días o más después de la internación, se asocia con índices más altos de mortalidad a los 12 meses.

National Cerebral and Cardiovascular Center, Suita, Japón
www.siicsalud.com/dato/resic.php/149853



Heart and Vessels
31(1):60-65, Ene 2016



Prevalencia de la Disfunción Eréctil en la Hipertensión Arterial

En una cohorte de hombres hipertensos, la prevalencia de disfunción eréctil fue elevada; el trastorno se asoció con otros factores de riesgo cardiovascular, como edad, tabaquismo y función renal. La detección de la disfunción eréctil, un marcador precoz de enfermedad cardiovascular, podría mejorar la valoración general del riesgo cardiovascular.

Università degli Studi di Genova, Génova, Italia
www.siicsalud.com/dato/resic.php/152571



Clinical and Experimental Hypertension
38(2):143-149, 2016



Escanee para asociarse al Programa

* ACISERA en Cardiología, dirigido a profesionales residentes, concurrentes y becarios de la especialidad. Desarrollado por Fundación SIIC, con la participación de CONAREC y el patrocinio exclusivo de Laboratorios ARGENTIA. Más información en: Fundación SIIC, programa ACISE. Tel. (+54 11) 4343-5767/ acisera@siic.info
www.siicsalud.com/main/cardiologia.php

