

# Depresión y Diabetes Mellitus Tipo 2, Enfoque Farmacológico

**Estudio de cohorte retrospectivo**

**n = 36 276 pacientes**

Tratamiento de la depresión y la DBT2	Reducción del riesgo de complicaciones macrovasculares	Disminución del riesgo de mortalidad
 <p><b>Antidepresivos con buen cumplimiento terapéutico</b></p>	<p><b>0.92</b></p>	<p><b>0.86</b></p>
 <p><b>Fármacos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS)</b></p>	<p><b>0.83</b></p>	<p><b>0.75</b></p>
 <p><b>Fármacos antidepresivos tricíclicos o tetracíclicos</b></p>	<p><b>—</b></p>	<p><b>0.78</b></p>

Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y depresión tienen peor pronóstico a largo plazo. El adecuado cumplimiento terapéutico con fármacos antidepresivos disminuye el riesgo de complicaciones macrovasculares y la mortalidad por cualquier causa.

El uso regular de antidepresivos se asocia con riesgo reducido de complicaciones avanzadas en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y depresión.

Resumen SIIC

**Antidepresivos y Variables Clínicas Avanzadas de la Diabetes en Pacientes con Depresión y Diabetes**

