

Eficacia de la Cariprazina en el Trastorno Bipolar I

Análisis *post hoc* de estudios controlados, a doble ciego y aleatorizados




Adultos (18-65 años) con trastorno bipolar I, con episodios maníacos o depresivos actuales



Cariprazina, dosis 3-12 mg/d (n = 596) vs. placebo (n = 421)

Escala MADRS: Depresión


0 – 6	Sin depresión
7 – 19	Leve
20 – 34	Moderada
35 – 60	Grave



Escala YMRS: Manía

≤ 12	Remisión
13 – 19	Síntomas mínimos
20 – 25	Leve
26 – 37	Moderada
38 – 60	Grave

Mejoría y cambio afectivo



CAET, cambio afectivo emergente con el tratamiento; MADRS, Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale; YMRS, Young Mania Rating Scale.

La cariprazina es eficaz en la reducción de síntomas maníacos y depresivos en el trastorno bipolar I, con bajo riesgo de cambio afectivo emergente. Mejora los síntomas en ambos polos del trastorno, sin empeorar los síntomas del polo opuesto.



Full-spectrum Efficacy of Cariprazine across...

366:136-145, Ago 2024

DOI: 10.1016/j.jad.2024.08.119

Universitat de Barcelona, Barcelona, España

Los pacientes con trastorno bipolar I pueden experimentar inestabilidad del estado de ánimo relacionada con el tratamiento, de modo que la terapia no debe inducir cambios en el estado afectivo. Se confirma que la cariprazina ejerce eficacia en el espectro sintomático completo, con riesgo bajo de cambios afectivos.

Resumen SIIC

Tratamiento de los Síntomas Maníacos y Depresivos en el Trastorno Bipolar I

Texto completo autorizado – TCA (full text): <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032724013533?via%3Dihub>



Ingresa al ReSIIC